

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Luaran Klinis Asam Valproat Pada Epilepsi Pediatri

Title	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Luaran Klinis Asam Valproat Pada Epilepsi Pediatri
Author Order	1 of 3
Accreditation	
Abstract	<p>Epilepsi merupakan penyakit kronis dengan prevalensi tinggi pada pediatrik. Salah satu obat anti epilepsi yang banyak diresepkan pada pediatrik adalah asam valproat. Luaran klinis utama pengobatan anti epilepsi adalah tercapainya periode bebas kejang. Tercapainya luaran klinis epilepsi sulit diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan luaran klinis pasien epilepsi pediatrik yang menggunakan asam valproat. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada orangtua/wali pasien. Epilepsi dikatakan terkontrol jika tercapai periode bebas kejang ≥ 6 bulan selama menggunakan asam valproat. Analisis data dilakukan dengan uji chi square atau uji Fisher, dilanjutkan dengan uji regresi logistik binomial. Pasien pada penelitian ini berjumlah 39 pasien. Sebagian besar pasien pediatri (64.1%) yang menggunakan terapi asam valproat memiliki epilepsi yang terkontrol, dengan 20 pasien (51.3%) menggunakan monoterapi asam valproat. Faktor yang berhubungan dengan luaran klinis pasien adalah jumlah obat antiepilepsi yang digunakan (p-value < 0.05).</p>
Publisher Name	Pharmacy Department, Faculty of Health Sciences, Jenderal Soedirman University, Purwokerto, Indonesia
Publish Date	2021-06-29
Publish Year	2021
Doi	DOI: 10.20884/1.api.2021.9.1.4060
Citation	
Source	Acta Pharmaciae Indonesia : Acta Pharm Indo
Source Issue	Vol 9 No 1 (2021): Acta Pharmaciae Indonesia : Acta Pharm Indo
Source Page	58-69
Url	http://jos.unsoed.ac.id/index.php/api/article/view/4060/2454
Author	Apt DEWI LATIFATUL ILMA, S.Farm, M.Clin.Pharm